《概率论与数理统计》第二周要点

学习要点: 等可能概型、几何概型、条件概率、全概率公式、 贝叶斯公式

- 1. 等可能概型(古典概型)
 - 特点:
 - 1. 样本空间有限;
 - 2. 每个基本事件发生的可能性相同。
 - 概率计算公式:

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

其中 |A| 是事件 A 中包含的基本事件数, |S| 是样本空间的基本事件总数。

典型例题 抛一枚硬币三次,设事件 A 为"恰有一次出现正面"。样本空间大小 |S| = 8, 而事件 A 的样本点有 $\{HTT, THT, TTH\}$, 所以

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{3}{8}.$$

2. 几何概型

• 定义: 当随机试验的样本空间是某一区域,并且每一点出现是等可能的,则事件 A 的概率定义为


$$P(A) = \frac{S_A}{S}$$

其中 S 为样本空间的度量(长度、面积或体积), S_A 为构成事件 A 的子区域度量。

• 说明: 当古典概型的试验结果为连续无穷多个时,就归结为几何概型。

典型例题: 会面问题 甲、乙两人约定在 0 到 T 时间段内到达,若先到者最多等待时 间 t 后离开,则他们能会面的概率为

$$p = \frac{$$
 阴影部分面积}{ 正方形面积} = \frac{T^2 - (T - t)^2}{T^2} = 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^2.



3. 条件概率

• 定义 (P(A) > 0):

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

- 性质: $P(\cdot|A)$ 本身满足概率的三个公理。
- 乘法公式:

$$P(AB) = P(B|A)P(A) = P(A|B)P(B)$$

• 推广:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

典型例题 一盒中有 3 件一等品、1 件二等品。设事件 A 为 "第一次取到一等品",事件 B 为 "第二次取到一等品"(不放回)。则

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6/12}{9/12} = \frac{2}{3}.$$

4. 全概率公式

设 $\{B_1, B_2, \ldots, B_n\}$ 是样本空间 S 的一个划分,且 $P(B_i) > 0$,则对任意事件 A:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)P(B_i)$$

典型例题 某电子厂元件由三家供应: $P(B_1) = 0.15$, $P(B_2) = 0.80$, $P(B_3) = 0.05$, 其次品率分别为 $P(A|B_1) = 0.02$, $P(A|B_2) = 0.01$, $P(A|B_3) = 0.03$ 。则随机取一件为次品的概率:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3)$$
$$= 0.02 \times 0.15 + 0.01 \times 0.80 + 0.03 \times 0.05$$
$$= 0.0125.$$

5. 贝叶斯公式

若 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 是样本空间 S 的一个划分, 且 P(A) > 0, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(A|B_j)P(B_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

典型例题 承接上题, 若已知取到的元件是次品, 求它来自 B_1, B_2, B_3 的概率:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.24,$$

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)} = \frac{0.01 \times 0.80}{0.0125} = 0.64,$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A)} = \frac{0.03 \times 0.05}{0.0125} = 0.12.$$

因此,该次品最可能来自供应商 B_2 。